

2022年4月高等教育自学考试全国统一命题考试

急救护理学

(课程代码 03007)

注意事项:

1. 本试卷分为两部分, 第一部分为选择题, 第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡(纸)指定位置上作答, 答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用 2B 铅笔, 书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

第一部分 选择题

一、单项选择题: 本大题共 30 小题, 每小题 1 分, 共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的, 请将其选出。

1. 理想的院前急救反应时间是
A. 1~2 分钟
B. 4~5 分钟
C. 8~10 分钟
D. 15~20 分钟
2. 急救医疗服务体系不包括
A. 院前急救
B. 急诊科急救
C. 手术室急救
D. 危重症监护
3. 下列属于病情可能随时危及生命、需立即进行救治的是
A. 胸痛疑似急性心肌梗死者
B. 急性意识障碍、无反应者
C. 呼吸困难明显血氧饱和度 93%者
D. 急性尿潴留患者
4. 静息状态下人体腋窝温度正常值不超过
A. 36.5°C
B. 37°C
C. 37.2°C
D. 37.6°C
5. 心绞痛患者疼痛的特点是
A. 压榨样疼痛
B. 刺痛
C. 撕裂样疼痛
D. 隐痛
6. 心肺复苏时所采取的系列急救措施中, 能够转复心律的措施主要是
A. 胸外按压
B. 开放气道
C. 人工呼吸
D. 电击除颤
7. 关于电解质钾的描述, 正确的是
A. 钾离子是细胞内的主要阳离子
B. 血清钾浓度的正常值是 2.5~4.5mmol/L
C. 肾的生理功能是保钾排钠
D. 酸中毒时可能会引发低钾血症
8. 关于休克治疗中补充血容量的说法, 不正确的是
A. 应遵循“需要多少补多少”的原则
B. 补液种类应先晶体液后胶体液
C. 补液速度应先快后慢
D. 尿量>20ml/h 提示血容量已补足
9. 下列情况中常导致等渗性缺水的是
A. 消化液的急性丢失
B. 大创面的慢性渗液
C. 高热患者大量出汗
D. 危重患者给水不足
10. MODS 治疗的关键是
A. 病情监测
B. 抗生素的应用
C. 祛除诱因控制原发病
D. 代谢支持
11. 气管插管气囊的压力一般保持在
A. 15-20mmHg
B. 15-20cmH₂O
C. 25-30mmHg
D. 25-30cmH₂O
12. 在急性肺血栓栓塞症患者的健康教育措施中, 旨在降低血液高凝状态的是
A. 积极治疗高脂血症
B. 术后患者抬高患肢
C. 避免长时间静坐
D. 长期卧床者应用间歇序贯加压充气泵
13. 下列体征中, 提示患者出现急性右心衰的是
A. 肺部啰音
B. 舒张期奔马律
C. 粉红色泡沫痰
D. 肝颈回流征阳性
14. 恶性高血压是指患者病情急骤发展, 舒张压持续大于等于
A. 150mmHg
B. 130mmHg
C. 110mmHg
D. 90mmHg
15. 我国急性胰腺炎最常见的病因是
A. 胆道疾病
B. 胰管梗阻
C. 酗酒和暴饮暴食
D. 手术损伤
16. 急性胰腺炎患者血清脂肪酶开始升高的时间多在起病后
A. 2~3h
B. 6~12h
C. 24~72h
D. 3~5 天

17. 高位肠梗阻患者一般不会出现电解质紊乱是
- A. 低钾血症 B. 低氯血症
C. 代谢性碱中毒 D. 代谢性酸中毒
18. 下列引发急性尿潴留的各类原因中属于动力性梗阻的是
- A. 尿道狭窄 B. 服用阿托品
C. 前列腺增生 D. 盆腔肿瘤压迫
19. 糖尿病患者出现尿量减少、皮肤黏膜干燥、眼球凹陷等症状，提示患者
- A. 肾功能损伤 B. 失水严重
C. 低血糖 D. 电解质紊乱
20. 尿毒症患者胰岛素治疗中容易出现低血糖，其原因是
- A. 血糖漏出过多 B. 胰岛素清除率降低
C. 食物摄入不规律 D. 机体营养不良
21. 糖尿病酮症酸中毒的主要表现不包括
- A. 多食 B. 烦渴多饮
C. 多尿 D. 乏力
22. 脑出血最常见的病因是
- A. 颅内肿瘤 B. 动静脉畸形
C. 颅内动脉瘤破裂 D. 高血压
23. 烧伤患者进行暴露疗法时，室温一般维持在
- A. 15~17℃ B. 18~20℃
C. 30~32℃ D. 36~38℃
24. 狂犬病患者的特殊症状是
- A. 吞咽困难 B. 四肢瘫痪
C. 肌束震颤 D. 恐水怕风
25. 下列不属于正常子宫收缩特点的是
- A. 节律性 B. 对称性
C. 剧烈性 D. 极性
26. 急性闭角型青光眼患者使用β-肾上腺素受体阻滞剂后应注意观察患者的
- A. 体温 B. 心率
C. 呼吸 D. 氧饱和度
27. 小儿急性喉炎的治疗关键是
- A. 止咳化痰 B. 营养支持
C. 防止高热脱水 D. 解除喉阻塞

28. 某环卫工人于室外作业时出现头晕、恶心、呕吐，休息后不缓解，遂至急诊。查体：神志清楚，大汗淋漓、面色苍白、皮肤湿冷，脉细速，R 20 次/分，BP 80/50mmHg，判断该患者的中暑类型为
- A. 先兆中暑 B. 轻症中暑
C. 热衰竭 D. 热射病
29. 镇静催眠药中毒患者洗胃最有效的时间范围是中毒后
- A. 6h 内 B. 8h 内
C. 10h 内 D. 12h 内
30. 有机磷农药中毒患者体内大量蓄积的物质是
- A. 胆固醇 B. 儿茶酚胺
C. 乙酰胆碱 D. 多巴胺

二、多项选择题：本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。在每小题列出的备选项中至少有两项是符合题目要求的，请将其选出，错选、多选或少选均无分。

31. 关于成人胸外按压的操作，正确的是
- A. 按压频率 100~120 次/分 B. 按压深度 3~4cm
C. 放松时手掌抬高离胸壁 D. 按压通气比为 15:2
E. 换人按压中断时间<5 秒
32. 低钙血症患者的急救护理措施包括
- A. 静脉注射 10%葡萄糖酸钙 B. 严密监测病情
C. 使用维生素 D 促进钙的吸收 D. 做好气管切开的准备
E. 在 1h 内大量输注生理盐水
33. 急性冠脉综合征包括
- A. 稳定型心绞痛 B. 不稳定型心绞痛
C. 急性心肌梗死 D. 缺血性心肌病
E. 隐匿性冠心病
34. 高渗性非酮症糖尿病昏迷患者血液检查的主要改变包括
- A. 血糖升高 B. 血酮体升高
C. 血浆渗透压升高 D. 血淀粉酶升高
E. 血 pH 值降低
35. 中暑治疗中药物降温的作用包括
- A. 防止肌肉震颤 B. 扩张周围血管
C. 调节体温中枢 D. 促进汗腺分泌
E. 降低机体氧耗

第二部分 非选择题

三、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

36. 简述 Wells 评分对肺血栓栓塞症患者进行初筛的主要参数。
37. 简述急性胰腺炎患者腹痛的特点。
38. 简述对脑卒中患者“FAST”判断法的主要内容。
39. 简述喉烫伤患者的急救护理措施。

四、论述题：本大题共 1 小题，10 分。

40. 论述气胸患者行胸腔闭式引流的护理要点。

五、病例分析题：本大题共 2 小题，每小题 15 分，共 30 分。

41. 患者，男性，69岁，吸烟30余年，20年前出现慢性咳嗽、咳痰，每年冬春季发病连续3个月以上，近5年来病情明显加重，常年发病，伴有喘息和呼吸困难，活动后加剧。3天前受凉后出现发热、剧咳、咳多量黄脓痰，不易咳出，气急、呼吸困难加重，伴发绀，自服“消炎药”并自行低流量吸氧，症状未减轻，急诊入院。查体：T 38.2℃，P 120次/分，R 30次/分，BP 130/80mmHg，半卧位，神清，唇颊发绀，球结膜水肿，皮肤温暖；桶状胸，双侧语颤对称减弱，叩诊呈过清音，两肺呼吸音减弱，呼气延长，闻及中等量干、湿性啰音，心音遥远，律齐，未闻及明显杂音。肝脾肋下未及，双下肢不肿。患者血气分析结果回报：pH 7.34，PaO₂ 52mmHg，PaCO₂ 54mmHg。

请写出：

- (1) 该患者呼吸困难的最可能原因；
 - (2) 对该患者分诊评估的要点；
 - (3) 按照四级病情分级标准该患者病情目前的等级。
42. 患者，男性，27岁，因“交通意外致全身多发伤半小时”急诊就诊。查体：T 36.9℃，R 32次/分，HR 116次/分，BP 78/50mmHg。头皮软组织瘀血肿胀，左胸第4~7肋内凹畸形伴压痛，左上腹压痛明显。

请写出：

- (1) 该患者的急救原则；
 - (2) 运用 VIPCO 程序针对该患者实施救护的措施。
- (注：V: ventilation, I: infusion, P: pulsation, C: control bleeding, O: operation)