

# 内科护理学（一）

（课程代码 02998）

## 注意事项：

1. 本试卷分为两部分，第一部分为选择题，第二部分为非选择题。
2. 应考者必须按试题顺序在答题卡（纸）指定位置上作答，答在试卷上无效。
3. 涂写部分、画图部分必须使用2B铅笔，书写部分必须使用黑色字迹签字笔。

## 第一部分 选择题

一、单项选择题：本大题共30小题，每小题1分，共30分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的，请将其选出。

1. 上下呼吸道的分界是  
A. 甲状软骨  
B. 环状软骨  
C. 环甲膜  
D. 声带
2. 大气道狭窄梗阻的典型表现为  
A. 突发胸痛伴双肺底湿啰音  
B. 吸气显著困难伴高调吸气性哮鸣音  
C. 呼气明显费力伴呼气相延长、广泛哮鸣音  
D. 吸气和呼气均费力伴双肺湿啰音
3. 患者，男性，56岁，因右肺肺炎住院治疗。护士指导其进行深呼吸和有效咳嗽，下列说法中不恰当的是  
A. 该措施有助于痰液排出  
B. 深呼吸时要进行腹式呼吸  
C. 数次深呼吸后呼气终了屏气片刻进行咳嗽  
D. 可定期（每2~4h）进行
4. 慢性肺源性心脏病发生的关键环节是  
A. 肺动脉高压  
B. 右心室肥厚  
C. 肺毛细血管增生  
D. 血液粘稠度增高

5. 心脏瓣膜病变最易累及的瓣膜是  
A. 二尖瓣  
B. 三尖瓣  
C. 主动脉瓣  
D. 肺动脉瓣
6. 对急性心肌梗死诊断敏感性和特异性最高的心肌损伤标记物是  
A. AST  
B. 肌酸磷酸激酶  
C. 肌钙蛋白T或I  
D. 乳酸脱氢酶
7. 患者，男性，60岁，因“间断头痛、耳鸣半年余”就诊，查血压增高，诊断为高血压。护士问诊发现患者日常饮食偏咸，需要告知其每日食盐量不应超过  
A. 3g  
B. 4g  
C. 6g  
D. 9g
8. 患者，男性，66岁，因病态窦房结综合征入院治疗并植入心脏起搏器。护士给予的健康指导内容中，不妥的是  
A. 自数脉搏高于起搏器设置频率时应立即就诊  
B. 避免接触高压电等发放强电磁波的物体  
C. 避免剧烈运动  
D. 定期随访测定起搏器功能
9. 慢性浅表性胃炎最主要的病因是  
A. 自身免疫  
B. 饮食因素  
C. 环境因素  
D. H.pylori 感染
10. 消化性溃疡最常见的并发症是  
A. 出血  
B. 穿孔  
C. 幽门梗阻  
D. 癌变
11. 肝硬化最突出的临床表现是  
A. 食管和胃底静脉曲张  
B. 脾肿大  
C. 出血倾向  
D. 腹水
12. 提示急性胰腺炎患者胰腺有大片坏死的表现是  
A. 高热  
B. 腹痛  
C. 腹胀  
D. 休克
13. 组成肾单位的是肾小体和  
A. 肾小管  
B. 肾小球  
C. 肾小囊  
D. 髓袢
14. 关于慢性肾小球肾炎的发病机制，说法错误的是  
A. 发病的起始因素多为急性链球菌感染  
B. 病程中的高血压导致肾小球内高压  
C. 肾功能不全时健存肾小球高滤过促进肾小球硬化  
D. 超负荷的蛋白饮食使肾小球负担过重

15. 慢性肾小球肾炎最主要的治疗目的是
- A. 消除蛋白尿                      B. 减轻血尿  
C. 防止肾功能进行性减退        D. 消除水肿
16. 急性肾功能衰竭最常见的病因是
- A. 下尿路梗阻                      B. 急性肾小管坏死  
C. 急性肾小球疾病                D. 急性肾间质病变
17. 胚胎后期的重要造血器官是
- A. 脾                                  B. 肝  
C. 骨髓                                D. 淋巴结
18. 引起出血性疾病的主要因素不包括
- A. 毛细血管壁异常                B. 血小板量或质的异常  
C. 凝血功能障碍                  D. 血液粘稠度异常
19. 过敏性紫癜最常见的临床类型是
- A. 紫癜型                            B. 腹型  
C. 关节型                            D. 肾型
20. 下丘脑合成的激素通过垂体门静脉系统进入
- A. 甲状腺                            B. 腺垂体  
C. 肾上腺                            D. 性腺
21. 诊断甲亢的首选指标是
- A. 血清 TT<sub>4</sub>、TT<sub>3</sub>                    B. 血清 TRH  
C. 血清 FT<sub>4</sub>、FT<sub>3</sub>                    D. 血清 TSAb
22. 糖尿病分类中与自身免疫相关的是
- A. 1 型糖尿病                        B. 2 型糖尿病  
C. 其他特殊类型糖尿病            D. 妊娠期糖尿病
23. 用于鉴别炎症性和非炎症性关节病变的检查是
- A. B 超检查                         B. 关节镜检查  
C. CT 检查                            D. 关节液检查
24. 系统性红斑狼疮患者的皮肤护理正确的是
- A. 皮肤瘙痒时可用力抓挠        B. 外出时打遮阳伞  
C. 使用化妆品遮盖红斑处        D. 每日以肥皂水清洗面部
25. 符合有机磷农药中毒患者烟碱样症状表现的是
- A. 恶心呕吐                         B. 流涎  
C. 支气管痉挛                       D. 肌纤维颤动
26. 劳力性中暑高热的特点是
- A. 体温调节功能障碍引起        B. 慢性病患者常见  
C. 发病与活动无关                D. 常表现为大量出汗
27. 关于隐性感染的描述, 错误的是
- A. 又称亚临床感染  
B. 机体不会发生特异性免疫应答  
C. 不引起或只引起轻微的组织损伤  
D. 可无明显的生化改变
28. 可经母婴传播导致感染的传染性疾病是
- A. 流行性脑脊髓膜炎              B. 伤寒  
C. 乙型肝炎                        D. 破伤风
29. 某地传染性疾病防疫监测体系确诊传染性疾病 1 例, 地方防疫部门对该确诊病例的接触者可采取的措施不包括
- A. 检疫措施                        B. 医学观察  
C. 预防接种                        D. 药物治疗
30. 患者, 男性, 28 岁, 因“发热伴乏力、纳差 3 天”入院, 经检查诊断为甲型肝炎。护士在为该患者制定消化道隔离计划时, 应考虑其传染性最强的时期为
- A. 起病前 4 周及起病后 2 周        B. 起病前 2 周及起病后 1 周  
C. 起病前 3 周                      D. 起病后 2 周

## 第二部分 非选择题

二、填空题：本大题共 15 空，每空 1 分，共 15 分。

31. 健康人是否发生肺炎决定于两个因素，即\_\_\_\_\_和宿主因素。
32. 人体对结核菌的特异性免疫力可通过接种\_\_\_\_\_或感染结核菌后获得。
33. 循环系统疾病时发生的胸痛常由心肌缺血、\_\_\_\_\_所致。
34. 心源性水肿首先出现在身体的\_\_\_\_\_部位。
35. 尿量是判断休克轻重的重要指标，若每小时尿量达 30ml 以上，是休克\_\_\_\_\_的一个重要指标。
36. 凡各种原因引起心脏\_\_\_\_\_或冲动传导的异常均能使心脏活动的规律发生紊乱，称为心律失常。
37. 肝性脑病可根据意识障碍程度、\_\_\_\_\_和脑电图改变分为四期。
38. 慢性肾功能衰竭患者的透析疗法包括血液透析、\_\_\_\_\_和口服透析液疗法。
39. 叶酸和/或维生素 B<sub>12</sub> 缺乏所引起细胞核 DNA 合成障碍的一类贫血称为\_\_\_\_\_。
40. 急性白血病的化疗过程分为两个阶段，即\_\_\_\_\_和缓解后（巩固强化）治疗。
41. 皮质醇增多症是各种原因导致肾上腺分泌过多\_\_\_\_\_所致。
42. 系统性红斑狼疮的主要病理改变为炎症反应和\_\_\_\_\_异常。
43. 急性一氧化碳中毒临床症状的严重程度与血液中\_\_\_\_\_含量密切相关。
44. 流行性乙型脑炎极期患者体温常高达 40℃ 以上，多呈\_\_\_\_\_热型。
45. 因艾滋病患者体质虚弱，免疫功能差，易发生继发感染，\_\_\_\_\_和皮肤常成为病原菌侵入门户。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

46. 支气管哮喘
47. 呕血
48. 晨僵
49. 中毒
50. 病毒性肝炎

四、简答题：本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

51. 简述消化性溃疡所致上消化道大量出血的止血措施。
52. 简述急性肾衰患者高钾血症的防治措施。
53. 简述弥散性血管内凝血患者的护理要点。
54. 简述甲状腺危象的常见诱因。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

55. 患者，女性，65 岁，因“反复咳嗽咳痰 30 余年，加重 1 周”入院。患者有支气管扩张病史 30 余年，每年均有发作。1 周前因受凉咳嗽咳痰加重，痰液呈黄色脓痰，300ml/d，静置分层，伴发热，体温最高 38.9℃。查体：T 38.6℃，P 90 次/分，R 20 次/分，BP 130/80mmHg，体型消瘦，面色苍白，杵状指，双侧呼吸运动对称，右下肺可闻及湿啰音。胸部 X 线显示右下肺呈蜂窝样改变，血常规示白细胞 14×10<sup>9</sup>/L。诊断为支气管扩张症（右下肺后基底段），给予抗感染、痰液引流以及营养支持治疗。

请写出：（1）该患者病情观察的重点；

（2）引流体位选择的原则及该患者的适宜体位；

（3）为该患者进行体位引流时的注意事项。

56. 患者，女性，75 岁，风湿性心脏病史 10 年，间断服用地高辛及呋塞米治疗。1 周前自觉心悸、呼吸困难，再次服用地高辛及呋塞米，原有症状缓解，但 2 天来出现食欲不振、恶心、呕吐，伴视物模糊，门诊就诊。查体：T 36.9℃，P 52 次/分，R 24 次/分，BP 110/75mmHg，HR 62 次/分，心律绝对不齐，心尖部可闻及舒张期和收缩期杂音。心电图示心房颤动伴长间歇，交界性逸搏心律，频发室性期前收缩。拟诊“洋地黄中毒”收入院进一步治疗。

请写出：（1）该患者符合洋地黄中毒的表现；

（2）地高辛的药理作用及特点；

（3）地高辛用药护理指导内容。